



Rosa Rubiginosa anemone-flora.

P. J. Rollet pinx.

Rosier Rouille à fleurs d'anémone.

Supplément de Rémond.

Langlois sculp.

LES ROSES.

25

ROSA RUBIGINOSA

(*anemone-flora*.)

R. geminata ovata subglobosa; pedunculi granuloso-hispidi; foliis subrotundis supra subpubescentibus, subtus glandulosis villosisque; cuneis petiolisque aculeatis; floribus 3-5 corymbosis; pappi inermis, involuti. (N.)

R. Rubiginosa anemone-flora. Thv. Prod. groupe XX, sp. 40, var. 1.

LE ROSIER ROUILLE.

(à fleurs d'anémone.)

DESCRIPTION

Cet arbrisseau s'élève en buisson à la hauteur de deux ou trois pieds. Les tiges et les rameaux adultes sont garnis d'aiguillons larges stipulaires, écartés; ceux des ramuscules de l'année sont en grand nombre, très-rapprochés entre eux. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles, un peu arrondies, vertes, presque glabres en-dessus, glanduleuses en-dessous et sur leur bordure, doublement dentées, d'une odeur vineuse. Le pétiole qui les supporte, velu, glanduleux, au point aiguillonné, est muni à sa base de stipules bifides denticulées en leur bord. Les fleurs naissent trois, quatre, et quelquefois plus, à l'extrémité des rameaux, où elles se réunissent en une espèce de corymbe; elles sont portées par des peduncules hispides-glanduleux. Les tubes des calices sont ovales et